

Wieś Jeziory, należąca częściowo do Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej, zawdzięcza swoją nazwę znajdującym się niegdyś na tym terenie głębokim stawom i podmokłym terenom. Pozostałością po nich są bagna śródlądowe należące do Leśnictwa Dąbrowa w Nadleśnictwie Złoczew (oddział 31C).

Bagna usytuowane są w korytarzu ekologicznym utworzonym w dolinie rzeki Żegliny. (Korytarz ekologiczny to teren szczególnej ochrony ekologicznej pełniący istotną rolę klimatyczną, wyróżniający się cennymi walorami krajobrazowymi, zwiększonym uwilgotnieniem terenu, a tym samym zwiększoną bioróżnorodnością). Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 22 IV 1996 r. opisywany teren, o powierzchni 66 arów, został uznany za użytek ekologiczny. Zgodnie z art. 42. ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 IV 2004 r. użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródlądowe oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo, ale cennych pod względem przyrodniczym obiektów. Ich ochrona polega przede wszystkim na pozostawieniu ich własnemu losowi bez ingerencji człowieka.

W tym przypadku ochroną objęto bagna z roślinnością charakterystyczną dla tego typu ekosystemów. Największą osobliwością florystyczną jest okazały **kosaciec żółty** (*Iris pseudacorus* L.

), zwany też irysem, który występuje tutaj w wyjątkowo dużym zagęszczeniu. Gatunek ten należy do gromady nasiennych, podgromady okrytonasiennych, klasy jednoliściennych, rzędu liliowców, rodziny liliowatych. Jest to najbardziej rozpowszechniony w naszym klimacie dziko rosnący irys. Jego wyprostowana łodyga dorasta niekiedy do 2 m wysokości. Żywozielone liście o szerokości 1 – 3 cm, mają długość do 1 m. Wyjątkowo efektowne są jaskrawożółte kwiaty o dość przyjemnym zapachu. Kosaciec kwitnie od maja do lipca, tworząc rozległe, żółte łany. Owocem jest wielonasienna, brązowa torebka o długości 4 – 7 cm. Warto wiedzieć, że kosaciec żółty zawiera trującą substancję o palącym smaku. Bydło, które zje liście kosaćca, dostaje gwałtownej, krwawej biegunki. Jednak z kłaczy kosaćca przygotowuje się leki wykrztuśne i przeciwmigrenowe. Stosuje się go też przy nudnościach i wymiotach oraz przy częstym zwracaniu pokarmu u niemowląt. Ponadto kłącze kosaćca zawiera olejki eteryczne wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym i cukierniczym.

Użytek ekologiczny na skraju wsi Jezioro

Autor Barbara Plichta

czwartek, 10 lutego 2011 22:38



Użytek ekologiczny na skraju wsi Jezioro

Autor Barbara Plichta

czwartek, 10 lutego 2011 22:38



Estylizacja wykładu grofów. Występowanie w miejscach podmokłych, wzdłuż brzozy. Różnorodność użytku